

Perfluorohexyloctane Eye Drop

Perfluorohexyloctane eye drop

Package Leaflet: information for the user

This is Perfluorohexyloctane, available with a prescription.

البيرفلوروهكسيلوكتان قطرة للعين

معلومات للمستخدم

متاح هذا الدواء بوصفة طبية من قبل الطبيب المختص



What is Perfluorohexyloctane, and what is it used for:

This medicine is not suitable for everyone. You should not receive it if you have an allergic reaction to Perfluorohexyloctane. However, medication treats the signs and symptoms of dry eye disease.



ما هو دواء البيرفلوروهكسيلوكتان وكيف يستخدم؟

هذا الدواء غير مناسب للجميع. يجب ألا تتلقى هذا الدواء إلا من قبل الطبيب المختص يستخدم هذا الدواء لعلاج حالات جفاف العين الشديدة



If you have any of these side effects, please tell your doctor or pharmacist:

Side effects may include blurred vision and conjunctival redness



How to take your Perfluorohexyloctane:

Your doctor will prescribe your dose and schedule.

Remove eye contacts before administration and leave them out for at least 30 minutes afterward.

One drop into the affected eye four times a day.

إذا كان لديك أي من هذه الآثار الجانبية، من فضلك أخبر طبيبك أو



الصيدلي :

قد تشمل الآثار الجانبية : عدم وضوح الرؤية واحمرار الملتحمة
كيف تتناول دواء البيرفلوروهكسيلوكتان

سوف يصف طبيبك الجرعة مع جدول مخصص لأوقات اخذ الجرعات

قم بإزالة العدسات اللاصقة قبل وضع القطرة ولا ترتديها الا بعد مرور نصف ساعة من الجرعة

يتم تقطير قطرة واحدة في العين المصابة أربع مرات في اليوم

Before you take Perfluorohexyloctane:

- ❖ Before using any other medicine, including over-the-counter medicines, vitamins, and herbal products, you must ask your doctor or pharmacist.

Tell your doctor if you are pregnant, breastfeeding, or if you have any other medical problem.

قبل أن تتناول البيرفلوروهكسيلوكتان

اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء آخر، بما في ذلك الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية والفيتامينات والمنتجات العشبية

أخبري طبيبك إذا كنتي حاملاً، أو مرضعة، أو إذا كان لديك أي مشاكل طبية أخرى



Contraindications of use Perfluorohexyloctane:

Severe hypersensitivity to Perfluorohexyloctane or any excipients of the product



موانع استخدام البيرفلوروهكسيلوكتان

فرط الحساسية الشديد للدواء أو أي من المنتجات المضافة للدواء




Storage of Perfluorohexyloctane:

Store at a controlled room temperature between 20 and 25 C.



تخزين البيرفلوروهكسيلوكتان

يخزن في درجة حرارة الغرفة بين 20 الى 25 مئوية .



Reference :

1. Product Information: MIEBO(TM) ophthalmic solution, perfluorohexyloctane ophthalmic solution. Bausch & Lomb Americas Inc (per FDA), Bridgewater, NJ, 2023.
2. Copilot Pro. iOS Application. Version 1.0. Redmond, WA: Microsoft Corporation; 2024

Juman Alsaab, Pharm D
Ministry of Health, Riyadh, SAUDI ARABIA.

Received: 10-04-2023;
Accepted: 27-08-2023.

Access this article online	
	www.ijpcs.net
	DOI: 10.5530/ijpcs.2024.13.23